



- MASTOPEXIE - + LIPOFILLING

La sortie d'hospitalisation :

Vous devez être accompagnée lors de votre sortie d'hospitalisation et ne pas rester seul(e) à domicile.

Les suites post-opératoires à domicile :

- >> Le repos est nécessaire les premiers jours, ne pas faire d'efforts.
- >> Évitez les grands gestes de bras les premiers temps. (Ne pas les lever plus haut que vos épaules).
- >> Éviter de porter des charges lourdes durant les 2 premiers mois qui suivent l'intervention (Pas de charges > à 5kgs).
- >> Contre la douleur, prenez les médicaments antalgiques qui vous ont été prescrits en respectant les doses journalières recommandées de manière systématique les 5 premiers jours puis à la demande les jours suivants.
- >> NE PAS APPLIQUER DE GLACE SUR VOS SEINS, vous pouvez en appliquer sur les zones de prélèvements.
- >> En journée, il est important de marcher régulièrement afin de stimuler la circulation sanguine et réduire le risque de phlébite. Évitez l'alitement prolongé le jour. Si des bas de contention vous ont été prescrits, pensez bien à les mettre. Si des injections d'anticoagulant vous ont été prescrites, pensez bien à les programmer avec une infirmière à domicile.
- >> Boire 2 litres d'eau/jour.
- >> Prendre des douches une fois/jour et non des bains en gardant les pansements. Retirer ensuite ces derniers, bien sécher, désinfecter avant d'appliquer de nouveaux pansements.
- >> Vous pouvez porter le soutien-gorge post-opératoire ou bien une brassière de sport pour le confort ou ne rien mettre.
- >> Les fils utilisés pour les sutures sont résorbables. Cependant, il est possible que des fils non résorbables soient mis en place. Une ablation de ces derniers sera programmée après évaluation de la cicatrisation à J15.
- >> La reprise d'une activité sportive douce pourra se faire à partir de 3 semaines, en respectant l'indolence, avec augmentation progressive de l'intensité sur 1 mois.

En cas d'apparition de signes tels:

QU'UN SEIN DOUBLANT DE VOLUME PAR RAPPORT À L'AUTRE / QU'UNE DOULEUR INSUPPORTABLE NON CALMÉE PAR LES ANTALGIQUES / UNE APPARITION DE FIÈVRE AU-DELA DE 38,5°C / UNE APPARITION DE NAUSÉES ET VOMISSEMENT / DES SAIGNEMENTS EXCESSIFS AU NIVEAU DES INCISIONS

Vous pouvez contacter le secrétariat du Dr DLIMI, l'hôpital ou bien le 15.

À NOTER :

BIEN VOUS PRÉSENTER AUX VISITES DE CONTRÔLE AVEC VOTRE MATÉRIEL POUR LES PANSEMENTS.

Après cicatrisation, procéder au massage des cicatrices avec une crème réparatrice, cela permettra d'améliorer leur souplesse et limiter les adhérences. Cela les aidera également à être moins visibles. (Cf. *Fiche explicative*) Pensez à bien protéger les cicatrices avec une protection solaire d'indice 50+ les 12 premiers mois post-opératoires. Gardez-les à l'abri des rayons du soleil et des lampes UV.